

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: CEREZO

# Guindo Tomatillo

**Tamaño:** Variado: grande, medio y pequeño.

**Forma:** Atonelada. Contorno irregular, aplastado acentuado en la parte de la sutura próxima a punto pistilar que le hace característico.

**Zona pistilar:** Característica por su irregularidad, aplastado sesgado hacia la sutura. **Punto pistilar:** Centrado o levemente desviado hacia el dorso.

**Sutura:** Incolora y casi inapreciable, situada en una depresión más o menos leve.

**Cavidad peduncular:** Amplia o media, muy marcada, rebajada en ambos lados. **Pedúnculo:** Pequeño y ensanchado en sus extremos.

**Piel:** Fuerte, brillante, transparente. **Color:** Rojo no llegando a rojo oscuro que, a veces, recubre en su totalidad. Fondo amarillo. Punteado incoloro.

**Carne:** Amarilla, algo transparente. **Sabor:** Desagradable, ácido, áspero.

**Jugo:** Áspero (tipo guinda). Medianamente jugoso.

**Hueso:** Grande, elíptico transversal.

**Maduración:** Segunda quincena de mayo en Aranda de Duero (Burgos).

